

INFORMACJE PRZED BADANIEM MAMMOGRAFICZNYM (MMG)

INFORMACJE O BADANIU

- w badaniu MMG wykorzystywane jest promieniowanie jonizujące (rentgenowskie), które pomimo licznych zalet nie jest obojętne dla organizmu, gdyż skumulowane dawki mogą mieć działanie potencjalnie szkodliwe
- czas samego wykonania badania wynosi zwykle 15-20 minut
- czas przebywania pacjenta w Zakładzie wynosi zwykle do 30 minut przy czym incydentalnie czas ten może się wydłużyć

DO BADANIA POTRZEBNE BĘDZIE:

- DOKUMENT tożsamości
- SKIEROWANIE – nie dotyczy badań skryningowych
- dotychczasowe dane kliniczne w celu umożliwienia PORÓWNANIA badań, a w szczególności:
 - wyniki poprzednich badań obrazowych piersi (wykonanych poza BCO-SM)
 - płytki CD/DVD z poprzednich badań (wykonanych poza BCO-SM)
 - w szczególności istotne będą wyniki badań piersi - USG, MR, oraz ewentualna dokumentacja medyczna dotycząca znanego/poszukiwanego rozpoznania

PRZED WEJŚCIEM DO PRACOWNI PACJENTKA MUSI DODATKOWO ZGŁOSIĆ PERSONELOWI PRACOWNI MOŻLIWOŚĆ BYCIA W CIĄŻY LUB OBECNĄ CIĄŻĘ, KTÓRA JEST BEZWGLĘDNYM PRZECIWWSKAZANIEM DO WYKONANIA BADANIA – U KOBIET W WIEKU ROZRODCZYM ZALECA SIĘ WYKONANIE BADAŃ W PIERWSZYCH 12 DNIACH CYKLU (LICZĄC OD POCZĄTKU KRWAWIENIA)

PRZED BADANIEM MMG:

- zdjęcie biżuterii, w szczególności z obszaru głowy i szyi
- prosimy o zadbanie o higienę obszaru badanego, w szczególności okolicy podpiersiowej i fałdów pachowych

W DNIU BADANIA:

- pacjent zgłasza się DO REJESTRACJI Zakładu Diagnostyki Obrazowej na 15 minut przed planowaną godziną badania
- z osobami niepełnoletnimi lub ubezwłasnowolnionymi zgłasza się także rodzic lub opiekun prawny
- pacjent przed badaniem podpisuje świadomą zgodę na wykonanie badania oraz wypełnia ankietę medyczną i ewentualne upoważnienia innych osób do odbioru wyników

PRZED ROZPOCZĘCIEM BADANIA KONIECZNIE PACJENT MUSI DODATKOWO ZGŁOSIĆ PERSONELOWI PRACOWNI:

- KAŻDĄ wcześniejszą reakcję uczuleniową na leki lub środki kontrastowe
- W SZCZEGÓLNOŚCI uczulenie na JOD i JODOWE środki kontrastowe
- skłonność do krwawień, zasłabnięć podczas zakładania wkłuc naczyniowych (wenflonu)
- możliwość bycia w ciąży lub obecność ciąży, która jest BEZWGLĘDNYM przeciwwskazaniem do wykonania badania TK – u kobiet w wieku rozrodczym zaleca się wykonanie badań w pierwszych 12 dniach cyklu (licząc od początku krwawienia)
- planowane leczenie radiojodem lub scyntygrafia tarczycy

PO BADANIU:

- po wynik należy zwrócić się do rejestracji ZDO lub poradni BCO-SM, w zależności od jednostki kierującej
- w celu otrzymania informacji o przybliżonym czasie oczekiwania na wynik badania należy zwrócić się do rejestracji ZDO
- wyniki pacjent może odebrać osobiście lub na podstawie upoważnienia osoba wskazana przez pacjenta w dokumentacji
- pacjent ma prawo do wypełnienia ankiety satysfakcji, której druk jest dostępny w rejestracji i przy wyjściu głównym z ZDO – wypełnione druki można składać w rejestracji Zakładu